

## DANSK NYRECANCER GRUPPE

### Nyrekraft under COVID-19

Nedenstående anbefalinger er udarbejdet grundet den aktuelle COVID-19 pandemi, som understregning og tillæg til allerede eksisterende anbefalinger. Anbefalingerne er af midlertidig karakter (3-6 måneder) og beslutninger taget på baggrund heraf, bør altid være baseret på en individuel, klinisk vurdering og journalføres.

Som udgangspunkt er hensigten, at der tages ekstra forholdsregler for de mest udsatte patientgrupper og ikke presserende, fysisk patientkontakt udsættes eller omstruktureres til virtuel kontakt.

Nedenstående ønskes iværksat med henblik på at nedsætte eventuel smitterisiko og sikre større kapacitet på hospitalerne, der formentlig snart underlægges stort pres.

**De herunder med rødt anførte anbefalinger er foreløbige og afventer endelig tilladelse fra Sundhedsstyrelsen.**

#### Kirurgiske patienter

- Patienter, med **nyretumorer under 3,5 cm.**, skal henvises til kontrolscanning om 6 måneder og svar gives ved telefonkonsultation
- Patienter, med **nyrecyster klassificeret som Bosniak I eller II**, skal afsluttes ved telefonkonsultation
- Patienter, med **nyrecyster klassificeret som Bosniak IIF**, skal ikke indkaldes til hospitalerne. Henvisninger skal afvises med besked om genhenvisning om 12 måneder.
- Patienter, med **nyrecyster klassificeret som Bosniak III**, skal henvises til kontrolscanning om 6 måneder og svar gives ved telefonkonsultation
- Patienter, **ældre end 70 år, med 1-2 risikofaktorer til COVID-19 og med nyretumorer under 7 cm., uden tegn på metastaser**, kan få deres operation udskudt i op til 3 måneder
- Patienter, med **normal kreatinin og eGFR**, skal ikke henvises til renografi, med mindre der er mistanke om nedsat nyrefunktion på urografien
- Konvertering af kontrolbesøg til telefon konsultationer hvor det er muligt stadigvæk forudgået af blodprøvetagning.

#### Onkologiske patienter

Alle onkologiske RCC-patienter behandles på trods af Corona. De onkologisk afdelinger har ledelsesmæssigt koordineret håndtering af patienter, så der er en ensartet holdning henover landet, som er i overensstemmelse med SST's retningslinjer